

Profilaxia da Endocardite Bacteriana na Criança com Cardiopatia

Nome: _____ Data de nascimento: ___/___/___

Morada: _____

Esta criança é portadora de cardiopatia e necessita de profilaxia da endocardite bacteriana.

Por favor consulte as indicações seguintes:

Alergia à penicilina: Sim ___ Não ___

Cuidados Gerais:

1. Higiene bucal cuidada
2. Não ter dentes cariados
3. Consulta periódica ao dentista
4. Tratar amigdalites, otites e outras infecções purulentas com antibióticos durante 10 dias

5. Deve ser feita profilaxia sempre que haja:

- a) Intervenções estomatológicas: extracções dentárias, brocagens, limpeza profissional, ou quaisquer procedimentos que envolvam sangramento gengival.
- b) Luxações traumáticas ou avulsões dentárias.
- c) Cirurgia ORL, excepto colocação de tubos de timpanostomia.
- d) Cirurgia digestiva ou urológica.
- e) Intervenções envolvendo tecido cutâneo infectado.

Esquema de Profilaxia da Endocardite Bacteriana

| Intervenções envolvendo a boca / orofaringe / aparelho respiratório superior | | |
|---|--|-------------------------------------|
| Esquema padrão | Amoxicilina * 50 mg/Kg (PO) | 1 hora antes do procedimento |
| Alergia à Penicilina Penicilina há < 7 dias | Clindamicina ** 20 mg/Kg (PO) | 1 hora antes do procedimento |
| *- Não exceder a dose máxima de 2 g (Amplamox, Clamoxyl, Oraminax) | | |
| **- Não exceder a dose máxima de 600 mg (Dalacin) | | |
| Intervenções envolvendo o aparelho digestivo / tracto uro-genital | | |
| Esquema padrão | Ampicilina 50 mg/Kg * IM ou IV + Gentamicina 3 mg/Kg IM ou IV e | 30-60 minutos antes do procedimento |

| | | |
|--|--|---|
| | Ampicilina 50 mg/Kg * IM ou IV | 6 horas depois |
| Alergia à Penicilina Penicilina há < 7 dias | Vancomicina 10 mg/Kg ** IV + Gentamicina 3 mg/Kg IV ou IM 1 a 2 horas antes (perfusão) | 30-60 minutos antes |
| *- Não exceder a dose máxima de 2 g **- Não exceder a dose máxima de 1 g de Vancomicina | | |
| Intervenções envolvendo o tecido cutâneo infectado (abcesso / furúnculos) | | |
| Esquema padrão | Flucloxacilina 50 mg/Kg * PO / IV / IM | 30 minutos antes repete 6 horas depois |
| Alergia à Penicilina Penicilina há < 7 dias | Clindamicina 20 mg/Kg (PO) | 1 hora antes do procedimento |
| *- Não exceder a dose de 2 g | | |

Todas as precauções devem ser mantidas, mesmo que tenha havido correcção cirúrgica da cardiopatia, excepto quando indicado.

Informação contida em desdobrável do Hospital de Sta. Marta - Lisboa
Tel. 213 529 440

Mais informação?
www.apa-cdc.pt